

MST : N'oubliez pas de vous protéger ! - 1/1

Samedi soir en boîtes de nuit, vacances... Les occasions de rencontre sont nombreuses. Mais attention, les maladies sexuellement transmissibles sont en pleine recrudescence...

Augmentation des blennorragies de 190% l'an dernier, retour de la syphilis, chlamydiae et papillomavirus toujours d'actualité... Les méthodes spécialisées dans le traitement des maladies sexuellement transmissibles sont inquiètes : "Nous craignons que cette recrudescence des MST ne soit annonciatrice d'une reprise de l'épidémie de sida". La multiplication de ces infections, constatée non seulement en région parisienne mais aussi dans tout la France, traduit en effet le retour de conduites à risques. Et les femmes sont de plus en plus concernées. Il faut donc continuer à se protéger lors d'un rapport sexuel (préservatif) et consulter rapidement (au moindre doute) afin de ne pas provoquer des contaminations en chaîne.

Des risques de stérilités définitives

Cela permet également de ménager son avenir. Certes, hormis le sida et l'hépatite B, la plupart de ces maladies sont bénignes. Mais lorsque le traitement est retardé, certaines peuvent causer des stérilités définitives, chez les femmes, comme chez les hommes. Un moment d'imprudence peut donc se payer cher très cher. Toute lésion de la peau ou des muqueuses génitales peut révéler une MST. Chez l'homme, il peut s'agir d'une ou plusieurs taches de couleurs variable, d'ulcérations ou de petites verrues au niveau du gland. Chez la femme, des rougeurs des ulcérations ou des vésicules au niveau de la vulve doivent alerter. Les symptômes génito-urinaires sont encore plus évocateurs. Les peuvent présenter un écoulement anormal, des brûlures ou des picotements le long de la verge, une gêne en urinant, des douleurs pendant les rapports ou au niveau des testicules. Les femmes se plaignent de pertes inhabituelles (épaisses, malodorantes, vertes...), de brûlures ou des rapports ou de démangeaisons vulvo-vaginales, des douleurs dans le ventre en urinant ou pendant les rapports